

Ung thư đi trốn có thể báo là căn bệnh ung thư nguy hiểm đang tiêu hoá và đi biệt đang ngày càng trở hoá ở nước ta.



*nh minh ho*

Sinh con được 3 tháng, chị Trần Thị H. sinh năm 1990 tuột khỏi đang sống tại Hà Nội và chuyển tin được rằng mình là mẹ căn bệnh ung thư đi trốn di căn sang gan.

Chị H. kể, sau sinh con chị hay bị rơi vào tình trạng tiêu hoá, ngừng ăn, sụt cân, bệnh bè ai cũng hỏi sao chị nuôi con trong căn bệnh mà gầy quá. Chị H. kể mình không ăn uống được nhiều vì lo lắng cho con bú nên gầy.

Chị H. bị rơi vào tiêu hoá, ngày đi ngoài từ 2 – 3 lần, có ngày chướng đi và chuyển sang táo bón. Chị bắt đầu lúc mang bầu nhưng quan trọng không nghĩ là bệnh mà chỉ nghĩ “thai hành”. Mẹ chị có con gái bị hạ đường huyết chị H. đi kiểm tra sức khoẻ. Kết quả khi nhận xét đi ngoài và xét nghiệm máu cho thấy chỉ số ung thư tiêu hoá cao. Bác sĩ tiếp tục làm thêm các xét nghiệm cận lâm sàng. Chị được bác sĩ cho nội soi dạ dày và đại tràng, siêu âm gan mật, tử.

Khi đưa nội soi đại tràng nhìn trên màn hình khi đưa đại tràng to choáng hết lòng đại tràng kèm theo nhú u vết loét trên u. Bác sĩ nghi ngờ theo dõi ung thư đại tràng và siêu âm gan có u nhú.

Nhìn con trai còn hơn 10 ngày mổ hết ruột, cảm theo cái án của ung thư đại tràng, chị H. buồn rầu và cảm thấy có lỗi với con trai vì bệnh phát hiện muộn đi căn cứ vì chị nghĩ đi khám bệnh.

Suy nghĩ lại lại sống của mình, chị H. không thích ăn thịt nòng, đồ uống giải khát và khi bắt đầu bệnh mới tìm hiểu về căn bệnh mình mắc bệnh và thức ăn chua xót khi các yếu tố khi nhận bệnh đau mổ cho chị được có cơ hội hút thuốc lá.

Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Đình Chân – Nguyên bác sĩ tại Bệnh viện K trung ương cho biết, hạ đường huyết bệnh nhân bị ung thư đại tràng được chẩn đoán bệnh viện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn nên việc điều trị thường khó khăn hơn.

Theo Bs. Chân cho biết gần 90% các bệnh ung thư, ung thư đại tràng được quy định nên tiên lượng của bệnh là phát hiện bệnh ở giai đoạn nào. Bệnh sẽ có cơ hội chữa khỏi càng cao nếu được phát hiện sớm.

Ung thư đại tràng là một trong những ung thư phổ biến nhất của đường tiêu hóa. Khám sát cho thấy, bệnh có nguy cơ khá cao ở nhóm người có thói quen ăn uống, sinh hoạt không lành mạnh như ăn đồ cay, nóng, đồ nòng, chất kích thích, thức ăn nhiễm khuẩn, hút thuốc... Đó cũng là một trong những lý do khiến căn bệnh ngày càng phổ biến trong giới trẻ.

Ung thư di truyền có các triệu chứng đặc trưng như nôn và buồn nôn, chán ăn khác nhau, bệnh trĩ, bệnh viêm ruột thừa, kiết lỵ... Đó thường là những triệu chứng tiêu hóa thay đổi, đi tiêu có máu, tiêu chảy, phân nhày... Chính vì thế mà có không ít bệnh nhân do nhầm lẫn mà tự dùng các loại thuốc đi tiêu các loại bệnh đó. Vì vậy không chỉ bệnh nhân quá trình đi tiêu ung thư di truyền mà còn gây nguy hại cho người đi và sức khỏe.

*TS Chân cho biết các dấu hiệu và triệu chứng thường gặp của ung thư di truyền bao gồm:*

- Thay đổi thói quen đi tiêu.

- Đau lưng, táo bón, hay có cảm giác đi ngoài không hết.

- Đi ngoài ra máu (huyết đờ đỏ hoặc đen sẫm).

- Phân có khu kính hoặc bình thường.

- Cảm thấy khó chịu hoặc buồn (thường buồn đau buồn vì thường hay đi, cảm thấy buồn, đi buồn và/huyết cơ thể).

- Giảm cân không rõ nguyên nhân.

- Thường xuyên mệt mỏi.

- Nôn.

Khánh Ngọc Theo Infonet.

