

Ung thư đi trốn có thể căn bệnh là căn bệnh ung thư nguy hiểm đang tiêu hoá và đi trốn đang ngày càng trở nên nguy hiểm.



*nh minh ho*

Sinh con được 3 tháng, chị Trần Thị H. sinh năm 1990 tuột khỏi đang sống tại Hà Nội và chuyển tin được rằng mình là mẹ căn bệnh ung thư đi trốn sang gan.

Chị H. kể, sau sinh con chị hay bị rơi vào tình trạng tiêu hoá, ngừng ăn, sụt cân, bệnh bè ai cũng hỏi sao chị nuôi con trong căn bệnh mà gầy quá. Chị H. kể mình không ăn uống được nhiều vì cho con bú nên gầy.

Chị H. bị rối loạn tiêu hóa, ngày đi ngoài từ 2 – 3 lần, có ngày chướng đi và chuyển sang táo bón. Chị bắt đầu lúc mang bầu nhưng quan trọng không nghĩ là bệnh mà chỉ nghĩ “thai hành”. Mẹ chị có con gái bị huyết sắc tố thì chị H. đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả khi nhận xét chẩn đoán và xét nghiệm máu chẩn đoán ung thư tiêu hóa cao. Bác sĩ tiến hành làm thêm các xét nghiệm cận lâm sàng. Chị được bác sĩ cho nội soi dạ dày và đại trực tràng, siêu âm gan mật, tử cung.

Khi đưa nội soi đại trực tràng nhìn trên màn hình khi u đại trực tràng to chướng hết lòng đại trực tràng kèm theo niêm mạc loét trên u. Bác sĩ nghi ngờ theo dõi ung thư đại trực tràng và siêu âm gan mật có u.

Nhìn con trai còn hơn 10 ngày mổ hết ruột, cảm theo cái án của ung thư đại trực tràng, chị H. buồn rầu và cảm thấy có lỗi với con trai vì bệnh phát hiện muộn đi căn cứ vì chị nghĩ đi khám bệnh.

Suy nghĩ lại lại sống của mình, chị H. không thích ăn thịt nạc, đồ uống giải khát và khi bắt đầu bệnh mới tìm hiểu và căn bệnh mình mắc hơn và thịt chua xót khi các yếu tố khi nhận bệnh đau mổ chữa đau có cần trợ hút thuốc lá.

Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Đình Chân – Nguyên bác sĩ tại Bệnh viện K trung tâm ung thư cho biết, huyết sắc tố bệnh nhân ung thư đại trực tràng được chẩn đoán bệnh viện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn nên việc điều trị thường khó khăn hơn.

Theo Bs. Chân cho biết gần 90% các bệnh ung thư, ung thư đại trực tràng được phát hiện đầu tiên thông qua bệnh là phát hiện bệnh ở giai đoạn nào. Bệnh sớm có cơ hội chữa khỏi càng cao nếu được phát hiện sớm.

Ung thư đại trực tràng là một trong những ung thư phổ biến nhất của đường tiêu hóa. Khám sát cho thấy, bệnh có nguy cơ khá cao ở nhóm người có thói quen ăn uống, sinh hoạt không lành mạnh như ăn đồ cay, nóng, đồ nướng, chất kích thích, thức phẩm nhiều dầu mỡ, hút thuốc... Đó cũng là một trong những lý do khiến căn bệnh ngày càng phổ biến trong giới trẻ.

Ung thư di truyền có các triệu chứng đặc trưng như nôn và những căn bệnh khác như bệnh trĩ, bệnh viêm ruột thừa, kiết lỵ... Đó thường là những triệu chứng tiêu hóa thay đổi, đi tiêu có máu, tiêu chảy, phân nhày... Chính vì thế mà có không ít bệnh nhân do nhầm lẫn mà tự dùng các loại thuốc đi tiêu các loại bệnh đó. Vì vậy không chỉ bệnh học quá trình đi tiêu ung thư di truyền mà còn gây nhiễu loạn xử lý và sức khỏe.

*TS Chân cho biết các dấu hiệu và triệu chứng thường gặp của ung thư di truyền bao gồm:*

- Thay đổi thói quen đi tiêu.

- Đau lưng, táo bón, hay có cảm giác đi ngoài không hết.

- Đi ngoài ra máu (huyết đờ đỏ hoặc đen sẫm).

- Phân có khu kính hoặc bình thường.

- Cảm thấy khó chịu hoặc bệnh (thường bệnh đau bụng vì thường hay đi, cả thường, đi bệnh và/huyết cơ thể).

- Giảm cân không rõ nguyên nhân.

- Thường xuyên mệt mỏi.

- Nôn.

Khánh Ngọc Theo Infonet.

